

**QUAENAM SIT  
PLURIBUS  
GRAVIDITATIS  
PHOENOMENIS  
HABENDA...**

---

Basilio Rusconi



QUAEDAM DE  
FLUVIIUS GRAVITATIS PHENOMENA  
HABENDA FIDES

**DISSERTATIO**  
*MEDICA INAUGURALIS*

QUAM

ASSUMPTIS  
MAGNifico DOMINO RECTORI  
AC ILLUSTR. FACULTATIS MEDICAE  
DIRECTORI ET DECANO  
PAC NON CLAUD. DA D. PROFESSORIBUS

PUB.

*MEDICINAE DOCTORIS*

GRADU ASSEQUENDO

IN CELEBRISSIMA TICINENSIS UNIVERSITATE

PUBLICAM FACIT

**BASILIVS RUSCONI**

LOGAVENNA.

—

TICINI REGII.

EX TIT. PUNI ET SOC. AGRICOL. CALABRIS.

1818.



*Signatura*



VIRI . CLARISSIMO

D. CAROLO CAIROLI

IN . INF. R. TICINENSI . ARCHIGYMNASIO

CHIRURGICAE . PROFESSORI

PRAECEPTORI . STUDIOSISSIMO

HABERE . STUDIORUM . FRUITUS

GRATI . ANIMI . DEVOTIQUE . MONUMENTO

DECAT . AUCTOR.



Quantum obstetrici medico de graviditate iudicium proferre difficultatis affert, abunde patet ex eo quod casus haud rari in historia medica reperiuntur, in quibus viri aliunde celebres, sed creduli nimis in errorem sunt ducti, interdum languentis etiam humanitatis detrimento, et horrere. Sed unde nam ipsorum fallax iudicium est ortum? Ab hac certe, quod illud fallacibus tantum phœnomenis consideratis, neque veris prægnantiae signis, peculiaribus nempe foetus motibus per explorationem recognitis statuere voluerunt. Ut igitur dissertationis argumentum sumeretur, quod, et communem utilitatem respiceret, de quamplurimum graviditatis signorum fallacia sermonem habere placuit. Ita enim si muneri nostro satisficientes, aliorum quoque uti-

## 6

litati connumerare possumus, nihil amplius nobis desiderandum superest, quam tritum semper in mente sit proverbium: *Nisi utile est quod facimus, stulta est gloria.*

Inter omnes, quae ab obstetriciae auctoribus recensentur, graviditatis signorum divisiones, exactior, atque perutilis arridet illa, quam clarissimus hujusce Athenaei Professor Caroli in suis praelectionibus tradit. Merito graviditatis signa in *Rationalia*, et *Sensibilia* dividit ipse, quorum postrema in *Probabilia*, atque *Certa* demum dissociat. *Rationalia* dicuntur, quae primitus apparent, nonnulla ipso eademque conceptionis actu, nonnulla paulo post se produnt, atque mutationibus insistantur, quas maxime utrum inter caeteraque corporis partes consentiens gratia, mulieris universali patitur. *Sensibilia Probabilia* in quatuor primis graviditatis mensibus evadunt, et a quibusdam inferioris uteri haemisphaerii, ipsius cervicis, atque utriusque explorationis gratia perceptis, pendunt. *Sensibilia Certa* demum post quantum mensum in medium se produnt, atque a foetus motibus praecipue, ipsiusque regulari usque ad partum evolutione,

7  
nos non ab uteri partium mutationibus  
per explorationem agnoscuntur. Sed  
inter omnia graviditatis signa posterius  
tantum, nempe sensibilia Certa, fo-  
minam in utero prolem portare, nos  
tutos facere possunt: neque enim quae  
Sensibilia et Probabilia, neque eo mi-  
nus quae Rationalia dicuntur ad gra-  
viditatem confirmandam valent. At-  
que ut hujusce assertantis veritas ma-  
gis electoret, ipsorum praecipua Ra-  
tionalibus inspicendo singillatim exami-  
nasse juvabit.

In coitu focuendo consensu ma-  
jorem voluptatem percipiunt mulieres,  
ad extasim neminem perducens,  
quaeque a copiosiori in haec loca hu-  
morem organo, atque amissione, a  
genitalibus turgescuntibus, uteri et vi-  
cinarum partium rigore forsan deriva-  
tur. Hoc vero signum ad graviditatem  
statuendam valebit? Quot mulieres ab  
alium, foras clitoridis sensibilitatem  
exquisite sensum sine facta con-  
ceptione perciperunt? Quot contra  
matres fieri, quin peculiarem in coitu  
expertae fuissent voluptatem, interdum  
etiam abhorrere adipem coguntur?  
Voluptatis sensum varium in mulieri-  
bus esse, et fallere posse ab conjugum



ignorantium, et foetidarum quatuor-  
dam attentionis habitudinem, testatur  
Felix Platerus Obs. lib. 1: pag. 260.,  
ubi quendam meminit, quae nequidem  
a primo matrimonialis concubitus actu  
nullam jucunditatem percipere.

Si fertis coitus fuerit, tremor uni-  
versalis succedit, languet valdopere foe-  
mina, etegro etiam cogitur ad som-  
num. Dolor exinde oritur quasi levi-  
oris colicae circa umbilicum (1) abdo-  
minis inflatio, spastica tensio, et re-  
pletio, motus, et calor vagans in inf-  
mo ventre, quae excipit horror totius  
seae corporis (2), artuum tremor, in-  
terquente leviori frigoris sensu, ventris sen-  
sibilitas adeo incremens, ut venter et  
ipsae fastidium afferant. Quid vero de  
hinc gravidarum symptomatum sit eru-  
dendum, quisque facillime concepit,  
etque videt, quoties ab aliis causis, a  
cuma mulieris sensibilitate, ab exaltata  
imaginatione pendere possint.

(1) Siquidem utrum habuit (mulier) circa  
ventrem, praeparat in Hippocr. Sect. V. aph. 41.,  
et Huculera illam dolorem in dextris, ut quasi  
sit un Brucellens de hoc ventre.

(2) Tenui corpus in contraxit intus. Huculera  
de part. pag. 247.



Zachias (1) scripserit, referremus : 2. Fac-  
 leissimum praegnantiae signum est  
 extranearum rerum appetentia, cum  
 et in non gravidis aliquando repe-  
 riatur, et in gravidis perpetua non  
 sit, sed ad tertiam aut quartam  
 mensum tantummodo perduret, a se-  
 cundo incipiens. Neque etiam gra-  
 vidis omnibus signum hoc est com-  
 mune, sed is praesertim familiae,  
 quae vel principatae sunt, vel in qui-  
 bus vitiosi humores cunctantur in  
 ventriculo ; sit enim hoc visum ex-  
 degi modo, quo pica, seu citra, te-  
 ste Gal. Aphor. 5. Aph. 61. Quod  
 maculae, quae in gravidis observantur,  
 scripsit jam Hippocrates (2). Quae vi-  
 ro gerunt, in facie maculas habent,  
 quas Ephylas vocant. Hanc vero sim-  
 plicem esse assercionem patet ex eo,  
 quod plurimae gravidarum eas maculas  
 non habeant, et multae non praegan-  
 tium in macula deturpentur, praeser-  
 tim quae aut non debito modo, aut  
 non sufficienter purgantur.

**Menstruorum deficientis praesipu-**

(1) Quaes. Med. Legib. lib. I. Tit. 2. Quaes. I.  
 (2) In lib. de nat.

um habetur graviditatis signum. Si  
medici, ait Hippocrates (1), purga-  
tiones non prodant, neque hinc,  
neque febre superveniente; eibi et-  
tem fastidia ipsi accedant, hanc in  
utero gerere putato. Defectum por-  
ro menstruatum signum esse pregnan-  
tiae salacissimum novimus, si a multi-  
plicibus causis prodire posse consider-  
amus, atque locum nonnullas abque  
ulla velocitatis noxa, quin utero pro-  
lem gestarent, die tribus menstruati-  
bus curasse.

Post menstruum suppressionem,  
mammas incrementum, ac duriciem ac-  
quirunt; dolorificae evadunt; earundem  
venae coerulesco colore conspicuae magis  
aferuntur; papilla incrementum, turgor et  
fit sensibiles; discus papillam ambiens  
in latius expanditur perypheriam,  
colore obscuriori notatur, parvisque pa-  
pilla tegitur; lactis tandem sero par-  
va quantitas in mammas colligitur: et  
profluit. Aliqua vero adiuncta emula  
in mammas phenomena ac mutationes  
nil ad Graviditatem penendam nobis cer-  
ti suppeditare queunt. Si menstrua de-

---

(1) Sect. V. Aph. 49.

gph. 49.

Scire, nil mirum: quod, manifestae mammae inter et uterum relationis gratia, turgescant mammae, intumescat papilla, areola extolatur. Equidem solacisquum erit signum lactis secretionis; nam et claque ex quod mulier utero gerat, lac aliquando in mammis illi innascitur, ipso auctoritate Hippocrate, Apher. Sect. 5. Apher. 39. Si mulier lac in mammis habet, neque gravidam est, neque peperit, hanc menstrua defecerunt. Signum hocce pariter infirmum reddit observatio, quod etiam in virginibus adhuc virum non expertis, vel menstruorum suppressione, vel quacunque alia de causa, lac interdum in mammillis colligatur. Sed quid ultra, si non solum in mulieribus non praegnantibus et in virginibus, sed etiam in viris lac in mammillis colligi interdum censuerunt? Hoc vidit Prolus Zachias, viderunt et alii, ac testatum reliquerunt (1), pluraque exempla habentur apud Schenckium, quia etiam Cardanus (2) refert testimonio illorum, quod

(1) E. Astruc. lib. I. de hist. anat.

Médec. de couch. mal. lib. I.

(2) Apher. Sect. 5. Apher. 39.

novam orbem instabant, viros pene omnes certis quibusdam locis maximam lactis copiam generare.

Præter ea, quæ hactenus recensuimus, signa Rationalia foemina fore omnibus communia, existet et alia singula mulieribus propria. Hæc vero quæ more accidentalia interdum, sæpe sæpius ab exaltata imaginatione profusque desiderio pendente occurrunt, nihili à Medico obstetrici habenda erunt.

At si cuncta Rationalia signa, quorum præcipua retulimus, obstetricem in tutum reddere nequeant, ut de Graviditate iudicium pœna certum præbere, cum ea ab illorum deficietia, nullam mulierem in utero prolem portare asserere poterit? Minime profecto. Et quis cuncta singillatim repetemus, quid certissimum à plerisque iudicatur examinamus incommode, menstruum videlicet status. Ex menstruum apparentia pro certo iudicare nequimus, mulierem utero non gerere, cum quadam et præcipue quæ valde temperamento sunt prædictæ, atque morali in statu copiose pergantur, prægnationem ad quartum, ad sextum mensem et etiam per totam graviditatis periodum

monstrantur: Hujusmodi exempla ob  
sactoribus præcipue a Schenckio re-  
censentur et clarissimus Zachius refert,  
de mulierem quandam curasse, quæ  
cum antequam conciperet non bene pur-  
garetur, dehinc utero gerens indis-  
cuncte purgabatur. Quia etiam mulie-  
rum exempla habentur quæ nunquam  
menstrus observant et tamen concep-  
erunt, aliarumque quæ solo gravid-  
tatis tempore menstrua purgatas fue-  
runt. Quibus omnibus concludere licet,  
venam esse nullam graviditatis asertio-  
nem quæ a presentia menstruum  
elicitur.

Sic postquam ex Rationalibus cau-  
tis symptomatibus nihil de Graviditate  
procerto haberi posse demonstravimus,  
ad signa quæ Sensibilia et Probabilia  
dicuntur examinanda gradum faciemus.

Primis a conceptionis diebus per  
internam explorationem, uti celeberr-  
mus Levret nobis refert, uteri cervix  
partibus adjacentibus callidior percipi-  
tur, quod a Begasego ferme stetiu in-  
utero post conceptum excitato pendet.  
Quantum vero acutimationem tale si-  
gnum merenter sequentes probant ob-  
servaciones: 1. quam ipse permanens  
sit locus, difficiliter percipiendi patet.

2. *accidentale* : propter vel ob aliquam partem istarum : necesse pendere potest ; & interdum penitus deficit , quomodo admodum praxi demonstravit ; aut non satis sensibile evadit , licet mulier cohabitum habuerit fecundum .

Orificium uteri clausum conceptionem denotare procerto habent mensurae . It. qui Hippocrati (1) auctoritatem imitatur ; quae in utero gerunt , harum ut uteri clausum est . Verum est credendum ; Hippocratem explorationem vel nunquam vel non quantum satis curat exercuisse , ut ex hypothesis tantum de gerentibus duxit . Illa enim temporibus putabatur uteri ut visibilibus spermiis aridum hians atque apertum videri ( quam intus obviam ire mentis virili descendendo ) ; post conceptionem vero claudere sicut ventres quos extincta . Huiusmodi praesentia signum est graviditatis fallacissimum deque se ipsius deficientia nihil contra tam deposuit . Et reversa steri ut in virginibus , excepta menstruum periodo , clausum invenitur ; in mulieribus ante conceptionem est clausum et non nisi factum

(1) See V. Aphor. 13. cited 'a.



16

coitus fornicandi uota aperitur. Neque  
contra uterū apertura clausa est in il-  
lis foeminis quae licet praegnae ad  
modicam vel ad totum usque gravidita-  
tis finem menstruantur; neque semper  
est clausa ante et post conceptionem  
in illis quae partu jam plura edide-  
runt.

— Major uteri, cervicis gravitas at-  
que mollior una cum mollioribus  
hanc partes illudens secretionibus, quae  
dum ab aliquibus tanquam signa gra-  
viditatem demonstrantia habentur, non ne  
ab aliis praeter gestationem capis pro-  
duci queant? Neque praeter acciden-  
talia vel morbi alicujus ea talia prae-  
cipue graviditatis effectum esse possunt?  
Et haec deficiuntibus, praegnantem uen-  
tre mulierem tuto asserabimus? Quo-  
ties, ne illo quidem horum symptom-  
matum existente, natum resper in utero  
gestabat mulier, quemadmodum in-  
super tempus demonstravit!

— Posterior arie uteri labium, quod  
in graviditate crescit et longitudine  
crescit, atque se alia signum est prae-  
gnantiae admodum impossibile. Dispo-  
sitionis enim congenitae vel saluae gravi-  
ditatis effectus esse potest. Cardiaci  
caeteroquin testatur, quid quod ali-

quidem experti sunt; admodum veritati  
consonum esse, uteri cervicem primis  
a conceptione mensibus illam semper  
aequalitatem praestitisse, verum an-  
terius modo labrum, modo posterius  
magis protractum inveniri. In foeminis  
autem, quae jam corpus pepererunt  
qualesdam hanc aestimationem signi huius-  
modi traxerunt, aut defectus mirari po-  
test; quod nos non letat, in eadem  
uteri cervicem atque orificium, propter  
attenuationem et foras lacerationem  
etiam in repetitis partibus perperant,  
inaequalia extare, valdeque irregu-  
laria? Tale igitur signum, licet mulier  
non sit praegnan, existere potest, uti  
contra deficit interdum, vera respice  
gravitatis cognita.

Oris uteri rima, quae fere transver-  
salem formam praebet; in mulieribus  
protophas, quae nondum conceperunt,  
primis graviditatis mensibus posse cir-  
cularis efficitur. Haec oris uteri muta-  
tio a Steen (1) pro certissimo praegnan-

(1) Il più stretto segno però dell'attuale pre-  
gnanza si è il cambiamento della forma orificiale  
dell'utero in una forma circolare. Questo si può  
ogni tanto veder di buon' occhio, e non si trova che stia  
l'abbile per uno uovo. Ecco tale ora tale più

tiae signum habetur: aut sita valde parere cum sefellit opinde. In prima enim graviditate ad eorum aliquam mereri potest acutisationem, ne multam quidem, cum et in ipsa quoque valde inconstans signum haberi debeat. Coetere quoties in mulieribus quae nunquam pepererunt ipsam os uteri circula rem figuram habere reperitur? Menstruorum accedente periodo, juxta Oulander, aliorumque (1) observationem uteri cervix formam acquirit fere rotundam, ipsiusque cribellam ideo figuram assumit circularem, quam tota menstruationis periode, et hinc etiam tribus diebus elapsis conservat. In mulieribus autem quae jam pluries ediderunt talem et tantam os uteri saepe saepius alterationem patitur, et signi hujusmodi praesentia vel defectus cum in errorem ducere posset, qui in judi-

---

la prima gravidanza, che seguita ad essere anche nelle gravidanze successive, benchè la quale compaia un poco più tardi, e non in una maniera esatta del tutto perfetta: V. Anna Oulander de G. G. Sive medicina de G. B. Monaccia Senonae a. cap. a. §. 153.

(1) Oulander. Forster. Cajrol. hoc idem per se observant.

nio de graviditate proficundo illi fidem habere vellet.

Falso quidem, autumat ipse Stein, aeque tutum praegnantiae signum credere mollem atque hemisphaericum tumorem, qui in anteriore uteri hemisphaerio inferioris pariete percipitur: illud enim tam accidentalis causae quam uteri morbus, ac, praesertim, falsa graviditas producere valent, atque interdum utero etiam praegnante decurrere potest.

In secunda a conceptione mensis, aeque magis prope tertium uterum in pelvis descendit, etque cervix in vaginam paululum detruditur, atque commodum exploratae tactui ac profecti, ita ut partes, quae antea deprehendi non poterant, hac gestationis epocha facillime percipiuntur. Hoc signum vero, quod tutum priusvisi videri posset, pro tali a Medico-Obstetricki nunquam est habendum. Et revera, non omnibus foeminis eadem est uteri cervicis matricis distantia, nonnullis altior, aliis vero brevior. Praeterea falsa graviditas, vagina brevior, ejusque prolapsu orificium uteri secum trahens, hydrops vel tympanicus uterum deharsum prebens, aliaeque hujusmodi morbosae affectiones, huic phaenomeno lor-

eum præbere possunt. Itidem ipsius defectus ad graviditatem excludendam nihil potius valebit, quoniam mulier ob vaginæ longitudinem majorem, proindeque altiorum uteri cervice positionem, etiam si prægnans, tale signum nequeat præferre.

Sic præceptis Rationalibus et Probabilibus prægnantiae signis rite perpensis, clarissime patet, quod ad tutum de graviditate judicium præferendum nulli potius haberi debeant; fortiusque motus tantummodo ne dum generales, sed et speciales, neque a matre testati, sed a Medico per explorationem recogniti sint considerandi.

# THESES DISQUIRENDAE.

---

## I.

*Matris lac primum infanti porrectum,  
ipsius saluti caldopere conducit.*

## II.

*Nulla datur puris effusio absque prae-  
gressu inflammationis.*

## III.

*In graviditate extrauterina gastroecmia  
participatur.*

## IV.

*Funiculi umbilicalis deligatio minus ne-  
cessaria exadit.*

## V.

*Cortex Peruvianus, granibus intermittens  
tibus non convenit.*

## VI.

*Causa morborum proxima idem est ac  
ipse morbus.*

## VII.

*Nervorum vis vitalis in systemate san-  
guineo ultima moritur.*

